

Concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 2 posti area dei
professionisti della salute e funzionari ruolo sanitario
Infermiere da assegnare presso le Aziende Sanitarie Provinciali
Ferraresi

PROVA PRATICA 01



1 Indicare il primo intervento da effettuare in presenza di una persona con un grave trauma cranico in ambito extraospedaliero:

- A** valutare la pervietà delle vie aeree
- B** eseguire una radiografia del cranio e della colonna cervicale
- C** rilevare i parametri vitali
- D** somministrare grandi quantità di liquidi



2 In quale dei seguenti eventi patologici il paziente deve essere posto in posizione laterale di sicurezza?

- A** Perdita di coscienza
- B** Infarto miocardico acuto
- C** Paziente gravemente ipoteso
- D** Frattura della colonna

3 Il sito di elezione per la somministrazione intramuscolare di un farmaco a un lattante è il muscolo:

- A** vasto laterale della coscia
- B** bicipite
- C** dorsogluteale
- D** deltoide

4 La misurazione della pressione venosa centrale va effettuata ponendo la persona assistita in decubito:

- A** supino
- B** semiortopnoico
- C** laterale destro
- D** laterale sinistro

5 Procedura: aspirazione endotracheale da tracheostomia. Indicare la sequenza corretta delle azioni:
 spiegare la procedura al paziente valutando la funzionalità respiratoria (1)
 durante la procedura di aspirazione monitorare la funzionalità respiratoria utilizzando gli strumenti disponibili (2)
 eseguire una prova di aspirazione occludendo l'apertura del catetere (3)
 rimuovere i guanti, smaltirli ed eseguire il lavaggio sociale delle mani (4)

- A** 1-3-2-4
- B** 2-4-3-1
- C** 3-4-1-2
- D** 2-1-4-3

Handwritten signature and date: 12/05/25

6 Le compressioni toraciche durante il massaggio cardiaco esterno devono essere eseguite con frequenza di:

- A almeno 100 compressioni al minuto e non più di 120
- B circa 60 compressioni al minuto
- C circa 120-150 compressioni al minuto
- D circa 250 compressioni al minuto



7 Rispetto alla corretta modalità di preparazione della colonscopia, indicare se ognuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o Falsa (F). 1) La dieta consigliata prevede di alimentarsi con cibi ad alto contenuto di fibre.

2) La dieta consigliata prevede di alimentarsi con frutta, cereali e ortaggi.

3) La dieta non è sufficiente a garantire una buona pulizia delle anse e va dunque associata all'assunzione di un lassativo.

4) La dieta non è sufficiente a garantire una buona pulizia delle anse e a volte deve essere associata alla somministrazione di microclismi.

- A 1-F; 2-F; 3-V; 4-V
- B 1-F; 2-V; 3-F; 4-F
- C 1-V; 2-V; 3-F; 4-F
- D 1-V; 2-F; 3-F; 4-V

8 Quale tra i seguenti segni e sintomi corrispondono al quadro clinico della disidratazione?

- A Secchezza della cute, ipotensione, tachicardia, oliguria
- B Secchezza della cute, ipotensione, bradicardia, polifagia
- C Secchezza della cute, ipotensione, tachicardia, poliuria, anisocoria
- D Secchezza della cute, tachicardia, poliuria, anisocoria


9 Dopo l'inserimento del catetere vescicale, tipo foley, per globo vescicale, il paziente riferisce dolore durante il gonfiaggio del palloncino. Cosa si ipotizza?

- A Il catetere non è ben posizionato
- B È normale perché ha globo vescicale
- C Il paziente ha un'infezione dell'uretra provocata dal globo vescicale, che provoca dolore
- D Nessuna delle altre alternative è corretta

10 Quale azione si intraprendono in un paziente tracheostomizzato che presenta rumori respiratori e secrezioni in prossimità della canula?

- A Si esegue una tracheoaspirazione
- B Si toglie la canula tracheostomica
- C È sufficiente applicare un filtro autoumidificante
- D Si sostituisce la canula tracheostomica

Handwritten signature and date: 13/05/23



**Concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 2 posti area dei
professionisti della salute e funzionari ruolo sanitario
Infermiere da assegnare presso le Aziende Sanitarie Provinciali
Ferraresi**

PROVA PRATICA 02



Prodotto con cellulosa certificata
FSC

E' una iniziativa
No Profit di AzzerCO2
di Leonardo Di Carlo

2022 | JDK-24-WDU

- 1 Quali sedi, fra gli elenchi indicati, si utilizzano per l'inserzione del Peripherally Inserted Central Catheter (PICC)?
- A** Vena basilica, vena brachiale e vena cefalica
 - B** Vena femorale, vena pedidia, vena cefalica
 - C** Vena cefalica, vena femorale, vena poplitea
 - D** Vena brachiale, vena femorale, vena poplitea



- 2 Un paziente portatore di drenaggio toracico a caduta, chiede di essere accompagnato in bagno. Come si procede?
- A** Mantenere il sistema chiuso di raccolta più basso rispetto al punto di inserzione nel torace
 - B** Sraccordare il sistema di raccolta a circuito chiuso pinzando il tubo di drenaggio per facilitare la deambulazione
 - C** Il paziente deve rimanere fermo a letto fino alla rimozione del drenaggio perché la deambulazione è pericolosa
 - D** Mantenere il sistema chiuso di raccolta più alto rispetto al punto di inserzione nel torace

- 3 In un paziente che è stato appena sottoposto a biopsia epatica è importante monitorare la comparsa di:
- A** dispnea
 - B** vomito
 - C** incontinenza urinaria
 - D** cefalea

- 4 Per favorire correttamente la rachicentesi, l'infermiere deve porre il paziente:
- A** decubito laterale sul margine del lettino con testa flessa verso il torace e ginocchia piegate sulla pancia
 - B** decubito prono al centro del lettino con la testa girata di fianco, le braccia e le gambe divaricate
 - C** decubito laterale al centro del lettino per sicurezza, con la testa perfettamente in linea con il tronco, gli arti inferiori distesi ed allineati al bacino
 - D** decubito prono al centro del lettino con le braccia lungo i fianchi e le gambe allineate

- 5 Marco, 7 anni, è stato portato al pronto soccorso per sospetta frattura tibia destra, viene trattato con apparecchio gessato. Dopo alcune ore la mamma chiama l'infermiera perché il bambino accusa dolore e parestesie alle dita del piede. Indicare l'azione più corretta.
- A** Segnalare immediatamente al medico per sospetta sindrome compartimentale
 - B** Rassicurare la mamma affermando che è normale percepire dolore
 - C** Eseguire lentamente delle manovre di mobilizzazione dell'arto per riattivare la circolazione
 - D** Applicare una fonte di calore per accelerare l'asciugatura dell'apparecchio gessato

13/05/25

Cortese Alessandra ML

- 6 Prescrizione di 875 mg di antibiotico per via intramuscolare, la fiala disponibile è da 1gr/4ml. Quanti ml di farmaco devono essere aspirati?
- A** 3,5 ml
B 3 ml
C 2,5 ml
D 2 ml



- 7 Rispetto all'utilizzo di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli sulla documentazione sanitaria, indicare se ognuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o Falsa (F).
- 1) L'uso non standardizzato di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli può indurre in errore gli operatori e causare danni ai pazienti.
 2) Nello scrivere la posologia di un farmaco è consigliabile utilizzare i numeri romani e non quelli arabi.
 3) Nello scrivere la posologia di un farmaco occorre mettere lo zero terminale dopo la virgola per le dosi espresse da numeri interi.
 4) Utilizzare solo l'acronimo per indicare i protocolli di chemioterapia.
- A** 1-V; 2-F; 3-F; 4-F
B 1-F; 2-V; 3-V; 4-F
C 1-V; 2-F; 3-V; 4-F
D 1-F; 2-V; 3-F; 4,F


- 8 Nella cura delle lesioni da pressione è fondamentale e irrinunciabile:
- A** l'eliminazione o la massima attenuazione della pressione sulla lesione
B l'utilizzo costante di presidi come materassi ad acqua o ad aria
C l'applicazione di garze grasse sulla lesione
D la detersione della lesione con soluzione fisiologica sterile

- 9 Per la rilevazione della pressione arteriosa come deve essere posizionato il paziente?
- A** Seduto con il braccio all'altezza del cuore
B In piedi
C Coricato con le gambe più basse del tronco
D Come preferisce il paziente

- 10 Quale dei seguenti interventi non è indicato se, durante l'alimentazione attraverso sondino nasogastrico, si manifesta vomito?
- A** Rimuovere il sondino
B Far assumere al paziente la posizione seduta
C Aspirare dal sondino
D Valutare la concentrazione e la velocità di somministrazione dell'alimento

1310512

Centesi Alessandra ML



**Concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 2 posti area dei
professionisti della salute e funzionari ruolo sanitario
Infermiere da assegnare presso le Aziende Sanitarie Provinciali
Ferraresi**

PROVA PRATICA 03



Prodotto con cellulosa riciclata
FSC

Una parte di carta
è prodotta da
AzzeroCO2

2022 | DK-24-WDU

G00001

- 1 La valutazione neurologica mediante la scala di misurazione del grado di coma "Glasgow" richiede l'osservazione di:
- A** risposte motorie, verbali e apertura occhi
 - B** risposte motorie, verbali e frequenza respiratoria
 - C** risposte motorie, verbali e pressione arteriosa
 - D** equilibrio e coordinamento nella deambulazione



G00002

- 2 Durante il monitoraggio Holter il paziente deve:
- A** condurre una vita normale
 - B** osservare il riposo assoluto
 - C** svolgere attività impegnative dal punto di vista fisico
 - D** alternare regolarmente periodi di riposo assoluto a momenti di intensa attività fisica

G00003

- 3 In caso di emergenza cardiologica i farmaci cardioattivi si possono somministrare attraverso il tubo endotracheale?
- A** Sì, ma in dosi superiori a quelle utilizzate per via endovenosa
 - B** No
 - C** Sì, ma in dosi inferiori a quelle utilizzate per via endovenosa
 - D** Sì, ma dopo broncoaspirazione

G00004

- 4 In caso di stravasamento durante la somministrazione endovenosa di farmaci antitumorali immediatamente occorre:
- A** interrompere la somministrazione del farmaco e aspirare il più possibile farmaco e sangue residui dal tubo o dal catetere
 - B** interrompere la somministrazione e rimuovere l'ago o il catetere
 - C** interrompere la somministrazione e attuare una fasciatura compressiva
 - D** rallentare il più possibile la velocità di somministrazione e chiamare il medico

G00005

- 5 Si ha una fiala di gentamicina da 40 mg/ml. Volendo somministrare al paziente 16 mg, quanti ml si devono impiegare?
- A** 0,4 ml
 - B** 0,5 ml
 - C** 0,2 ml
 - D** 0,3 ml

- 6 Per l'esecuzione di un prelievo di sangue venoso a scopo di emocoltura, il campione deve **essere** di norma prelevato:
- A** durante un episodio di aumento della temperatura corporea
 - B** solo se la temperatura supera i 39°C
 - C** almeno un'ora dopo un episodio di aumento della temperatura corporea
 - D** almeno tre ore dopo un episodio di aumento della temperatura corporea




- 7 Il lavaggio delle mani prima di iniziare una procedura infermieristica è necessario:
- A** sempre
 - B** solo se non si indossano i guanti
 - C** solo se si indossano i guanti sterili
 - D** solo se l'infermiere presenta delle soluzioni di continuo (ferite o abrasioni) sulle mani

- 8 In un paziente febbrile:
- A** compare il brivido nella prima fase quando la temperatura sale
 - B** compare il brivido nella terza fase quando la temperatura scende
 - C** compare sudorazione nella prima fase quando la temperatura aumenta
 - D** scompare la sudorazione all'inizio della terza fase quando la temperatura diminuisce

- 9 Il polso popliteo è palpabile:
- A** dietro il ginocchio
 - B** dietro il malleolo
 - C** a livello del 5° spazio intercostale
 - D** sul dorso del piede

- 10 Riguardo la sostituzione della medicazione del catetere venoso periferico indicare se ognuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o falsa (F).
- 1) È preferibile una medicazione semipermeabile trasparente.
 - 2) La medicazione deve essere sempre sostituita ogni turno.
 - 3) L'uso di pomate o creme antibiotiche è sempre raccomandato.
 - 4) È necessario disinfettare il punto di inserzione prima di applicare una nuova medicazione.
- A** 1-V; 2-F; 3-F; 4-V
 - B** 1-F; 2-F; 3-V; 4-V
 - C** 1-V; 2-V; 3-V; 4-V
 - D** 1-F; 2-V; 3-F; 4-V



Concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 2 posti area dei
professionisti della salute e funzionari ruolo sanitario
Infermiere da assegnare presso le Aziende Sanitarie Provinciali
Ferraresi

PROVA PRATICA 04



1 Quale tra i seguenti segni e sintomi corrispondono al quadro clinico della disidratazione?

- A** Secchezza della cute, ipotensione, tachicardia, oliguria
- B** Secchezza della cute, ipotensione, bradicardia, polifagia
- C** Secchezza della cute, ipotensione, tachicardia, poliuria, anisocoria
- D** Secchezza della cute, tachicardia, poliuria, anisocoria



2 Dopo l'inserimento del catetere vescicale, tipo foley, per globo vescicale, il paziente riferisce dolore durante il gonfiaggio del palloncino. Cosa si ipotizza?

- A** Il catetere non è ben posizionato
- B** E' normale perché ha globo vescicale
- C** Il paziente ha un'infezione dell'uretra provocata dal globo vescicale, che provoca dolore
- D** Nessuna delle precedenti è corretta

3 Quale azione si intraprendono in un paziente tracheostomizzato che presenta rumori respiratori e secrezioni in prossimità della canula?

- A** Si esegue una tracheoaspirazione
- B** Si toglie la canula tracheostomica
- C** E' sufficiente applicare un filtro autoumidificante
- D** Si sostituisce la canula tracheostomica

4 Prescrizione di 875 mg di antibiotico per via intramuscolare, la fiala disponibile è da 1gr/4ml. Quanti ml di farmaco devono essere aspirati?

- A** 3,5 ml
- B** 3 ml
- C** 2,5 ml
- D** 2 ml

5 Rispetto all'utilizzo di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli sulla documentazione sanitaria, indicare se ognuna delle seguenti affermazioni è Vera (V) o Falsa (F). 1) L'uso non standardizzato di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli può indurre in errore gli operatori e causare danni ai pazienti 2) Nello scrivere la posologia di un farmaco è consigliabile utilizzare i numeri romani e non quelli arabi 3) Nello scrivere la posologia di un farmaco occorre mettere lo zero terminale dopo la virgola per le dosi espresse da numeri interi 4) Utilizzare solo l'acronimo per indicare i protocolli di chemioterapia

- A** 1-V; 2-F; 3-F; 4-F
- B** 1-F; 2-V; 3-V; 4-F
- C** 1-V; 2-F; 3-V; 4-F
- D** 1-F; 2-V; 3-F; 4-F

H00006

6 Il lavaggio delle mani prima di iniziare una procedura infermieristica è necessario:

- A** sempre
- B** solo se non si indossano i guanti
- C** solo se si indossano i guanti sterili
- D** solo se l'infermiere presenta delle soluzioni di continuo (ferite o abrasioni) sulle mani



H00007

7 In un paziente febbrile:

- A** compare il brivido nella prima fase quando la temperatura sale
- B** compare il brivido nella terza fase quando la temperatura scende
- C** compare sudorazione nella prima fase quando la temperatura aumenta
- D** scompare la sudorazione all'inizio della terza fase quando la temperatura diminuisce

H00008

8 Quale delle seguenti procedure va eseguita per prima in caso di politrauma?

- A** Proteggere la colonna cervicale e le vie aeree superiori
- B** Esaminare lo stato neurologico
- C** Controllare lo stato emodinamico
- D** Garantire un'adeguata ventilazione

H00009

9 In caso di arresto cardiaco è necessario:

- A** eseguire massaggio cardiaco
- B** cardiovertire
- C** ventilare
- D** attendere il medico

H00010

10 L'amiodarone è un farmaco che deve essere diluito preferibilmente:

- A** in soluzione glucosata al 5%
- B** in soluzione fisiologica
- C** in soluzione elettrolitica
- D** in soluzione di acqua deionizzata