

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

**Concorso Pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di Ostetrica -
Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari - da
assegnare presso le Aziende Sanitarie Provinciali Ferraresi**

PROVA SCRITTA 01



-
- 1 **Durante la gravidanza quali tassi di prevalenza per la nausea sono riportati in letteratura?** A00001
- A** Tra il 50% e l'80%
 - B** Oltre il 90%
 - C** Tra 10% e 20%
 - D** Sotto il 3%
-
- 2 **Quale dei seguenti valori ormonali è diagnostico di menopausa?** A00002
- A** FSH (ormone follicolo stimolante) elevato
 - B** Prolattina elevata
 - C** Estradiolo basso
 - D** Nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 3 **Quale di queste affermazioni sulla contraccezione intrauterina è corretta?** A00003
- A** In Italia è utilizzata da circa 300.000 donne
 - B** Viene utilizzata solo nelle pluripare
 - C** È un metodo contraccettivo meno efficace della contraccezione ormonale
 - D** Deve essere inserita non prima di 60 giorni dal parto
-
- 4 **Quali di queste affermazioni non è vera sulle MST?** A00004
- A** Sono facilmente diagnosticabili perché subito sintomatiche
 - B** I tassi di prevalenza le collocano fra le più diffuse cause di morbidità nella popolazione in età fertile ed economicamente produttiva (15-49 anni)
 - C** Determinano sequele e complicanze, spesso severe, soprattutto a carico dell'apparato genitale femminile
 - D** Giocano un ruolo nell'incrementare il rischio di trasmissione dell'HIV
-
- 5 **L'inositolo viene anche chiamato:** A00005
- A** Vitamina B7
 - B** Vitamina B9
 - C** Vitamina B5
 - D** È un ormone

- 6 A00006
- I prebiotici: secondo la definizione del ministero della salute:**
- A** sono sostanze non digeribili di origine alimentare; quando sono assunti in quantità adeguata, favoriscono selettivamente la crescita e l'attività di uno o più batteri già presenti nel tratto intestinale o che vengono assunti insieme al prebiotico e sono fondamentalmente fibre alimentari solubili che si trovano nella frutta e nella verdura
 - B** sono solo sostanze non digeribili di origine alimentare
 - C** quando sono assunti in quantità adeguata, favoriscono selettivamente la crescita e l'attività di uno o più batteri già presenti nel tratto intestinale o che vengono assunti insieme al prebiotico, esclusivamente
 - D** sono solo fondamentalmente fibre alimentari solubili che si trovano nella frutta e nella verdura

- 7 A00007
- L'assorbimento del ferro è favorito da:**
- A** Ac. Ascorbico (vit. C)
 - B** Colecalciferolo
 - C** Vit. E
 - D** Vit. B

- 8 A00008
- I cosiddetti "livelli essenziali di assistenza" (LEA), introdotti con il D.Lgs. 502/1992, rappresentano:**
- A** le prestazioni sanitarie minime da garantire a tutti i cittadini dal Servizio Sanitario Nazionale
 - B** i trattamenti sanitari ritenuti appropriati ed efficaci sulla base della revisione della letteratura scientifica
 - C** le attività di prevenzione sanitarie garantite dalle strutture extraospedaliere
 - D** la dotazione organica minima di personale sanitario ai fini dell'accreditamento

- 9 A00009
- Per la rilevazione dei fattori di rischio psicosociali e di depressione post-partume, le domande di Wooley:**
- A** non consentono di porre diagnosi di depressione post partum in quanto test di screening
 - B** sono un test diagnostico che permette di individuare circa l'100% delle donne con depressione post-partum
 - C** sono un test di screening che permette di individuare circa l'80% delle donne a rischio di depressione post-partum
 - D** sono un test diagnostico per la depressione post partum solo se somministrate da uno psicologo o psichiatra

- 10 A00010
- Per una corretta gestione dei rischi in una sala criobiologica quale documento definisce le caratteristiche organizzative, strutturali e tecnologiche che la sala criobiologica deve possedere per garantire il più alto livello di Qualità e Sicurezza delle cellule e tessuti crioconservati finalizzati all'uso clinico e il più alto livello di Sicurezza per il personale addetto?**
- A** Le "Linee Guida per la sala criobiologica di un istituto dei tessuti" 2014
 - B** Manuale per la gestione di un laboratorio di PMA
 - C** Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro"
 - D** Nessuna delle altre alternative è corretta

-
- 11 A00011
Il taglio cesareo peri-mortem, in una gravida in arresto cardiaco dopo la 20° settimana di gestazione, deve essere eseguito entro:
A 4 minuti
B 10 minuti
C 15 minuti
D 20 minuti
-
- 12 A00012
Le donne che hanno una pressione sistolica maggiore o uguale a 160 mmHg necessitano di un trattamento antipertensivo?
A Sì
B No
C Solo dopo l'insorgenza di condizioni cliniche sfavorevoli
D Solo se presenti edemi agli arti inferiori
-
- 13 A00013
Dopo un test HPV (Human Papilloma Virus) primario negativo quale è l'intervallo di tempo di screening?
A 5 anni
B 2 anni
C 3 anni
D 1 anno
-
- 14 A00014
Gli algoritmi della comunicazione nel sostegno all'allattamento al seno hanno come primo momento quello di:
A fare domande esplorative
B fornire informazioni
C introdurre l'argomento esplicitando l'obiettivo
D fornire dati statistici utili per argomentare l'utilità
-
- 15 A00015
Quando un professionista deve consigliare alla donna di assumere un farmaco (es: acido folico) pur in assenza di sintomi:
A deve accogliere ed esplorare le eventuali resistenze e accompagnare la donna nella scelta
B deve richiamare alla ragionevolezza
C deve argomentare su tutti i rischi possibili se la donna non aderisce al comportamento richiesto
D deve mostrarsi fermo e categorico perché egli possiede le conoscenze scientifiche
-

-
- 16 A00016
- Si definisce fallimento dell'induzione del travaglio di parto:**
- A** qualora non si riesca a raggiungere una fase attiva del travaglio dopo almeno 15 ore di infusione ossitocica e membrane rotte
 - B** qualora non si riesca a raggiungere una fase attiva del travaglio dopo 8 ore di infusione ossitocica e membrane integre
 - C** qualora la donna rifiuti la prosecuzione dell'induzione con ossitocina o un ulteriore ciclo di maturazione cervicale
 - D** nessuna delle altre alternative è corretta

-
- 17 A00017
- La scala di Borg:**
- A** è una scala di percezione dello sforzo; serve a valutare la percezione soggettiva dello sforzo fisico in relazione all'entità o intensità dello stesso durante l'attività fisica e in base a questo si può prescrivere un programma di allenamento individualizzato nella donna in gravidanza
 - B** può essere utilizzata per prescrivere un programma di allenamento individualizzato nella donna in gravidanza
 - C** è una scala di percezione dello sforzo, serve a valutare la percezione soggettiva dello sforzo fisico in relazione all'entità o intensità dello stesso durante l'attività fisica
 - D** è uno strumento utile per valutare le condizioni di salute del neonato alla nascita

-
- 18 A00018
- La sorveglianza materno-fetale durante l'induzione del travaglio di parto:**
- A** prevede la valutazione pre-induzione, la valutazione prima dell'insorgenza del travaglio attivo e la sorveglianza materno-fetale durante il travaglio attivo
 - B** prevede la sola sorveglianza materno-fetale durante il travaglio attivo
 - C** prevede un solo monitoraggio cardiotocografico di 30-60 minuti subito dopo l'applicazione del metodo prescelto per l'induzione
 - D** prevede un solo monitoraggio cardiotocografico di 20-40 minuti subito dopo l'applicazione del metodo prescelto per l'induzione

-
- 19 A00019
- Placenta previa è una condizione in cui:**
- A** la placenta viene a trovarsi davanti alla parte presentata, impiantandosi in corrispondenza del SUI ed in particolare a meno di 20 mm dall'OUI (orifizio uterino interno)
 - B** la placenta si impianta a meno di 30 mm dall'OUI (orifizio uterino interno)
 - C** i villi placentari penetrano nel miometrio senza interessare la sierosa uterina
 - D** i villi placentari aderiscono in modo anomalo al miometrio senza interposizione di decidua tra i due

-
- 20 A00020
- In caso di EPP (Emorragia Post Partum) con una perdita ematica fino a 1000 ml, dal punto di vista clinico:**
- A** in genere non si hanno modificazioni pressorie e la paziente può presentare solo palpitazioni e tachicardia
 - B** si ha sempre spiccata ipotensione con sudorazione e tachicardia
 - C** non si hanno mai modificazioni pressorie
 - D** nessuna delle altre alternative è corretta

-
- 21 A00021
Quali sono gli interventi che riducono il rischio di parto operativo vaginale?
A L'adozione della postura eretta o di fianco durante il periodo espulsivo; l'appropriato e mirato utilizzo dell'ossitocina e il ritardo nelle spinte attive materne fino a quando non insorge il premito irrefrenabile soprattutto in caso di peridurale
B Solo l'adozione della postura eretta o di fianco durante il periodo espulsivo
C Solo l'appropriato e mirato utilizzo dell'ossitocina
D Solo il ritardo nelle spinte attive materne fino a quando non insorge il premito irrefrenabile soprattutto in caso di peridurale
-
- 22 A00022
Nella valutazione di una paziente con prolasso genitale, quale fra i seguenti determinanti è di maggiore importanza nel decidere se e come trattare il prolasso?
A Grado di compromissione della qualità di vita e desiderio della paziente
B Età
C Grado di prolasso
D Compartimento interessato dal prolasso
-
- 23 A00023
Quale è l'effetto della secrezione di prolattina in puerperio?
A Far produrre il latte
B Far fuoriuscire il latte
C Far contrarre l'utero
D Far accumulare il latte
-
- 24 A00024
Il principale ruolo per un operatore sanitario che aiuta una mamma ad allattare è:
A centrare l'attenzione sul benessere della madre
B insegnare alla madre i segni del buon attacco al seno
C attaccare il bambino al seno della madre
D verificare che la madre conosca le regole del buon attacco
-
- 25 A00025
A seguito di una biopsia su guida colposcopica viene diagnosticata una lesione CIN1 ad una donna di 28 anni, l'iter successivo prevede:
A HPV test a 12 mesi
B Conizzazione con ansa diatermica
C Conizzazione con bisturi a lama fredda
D PAP test a 12 mesi
-

26

A00026

I dati sensibili sono:

- A** dati inerenti lo stato di salute, le abitudini, il credo politico, origine razziale\etnica, convinzioni religiose
- B** dati anagrafici
- C** dati relativi lo status economico\sociale
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

27

A00027

L'ostetrica in quanto figura professionale può svolgere in autonomia tutte le attività che le competono?

- A** In quanto professione intellettuale può svolgere in autonomia le attività previste dal proprio Profilo Professionale
- B** Svolge in autonomia solo le attività che il medico di guardia gli permette di attuare
- C** Solo le Libero Professioniste svolgono in autonomia le attività previste dal Profilo Professionale
- D** Può svolgere in autonomia alcune attività solo se è assunta in una struttura sanitaria pubblica

28

A00028

L'atteggiamento del feto in utero è:

- A** il rapporto che le singole parti assumono tra loro
- B** il rapporto tra il maggior asse fetale e il maggior asse dell'utero
- C** il rapporto tra gli indici fetali e quelli materni
- D** il rapporto tra l'indice di presentazione e della sua maggior circonferenza con i vari piani del canale de parto

29

A00029

La diagnosi di mancato impegno della parte presentata si fa:


- A** entro un'ora dalla dilatazione completa
- B** dopo 30 minuti che la parte presentata rimane stazionaria ad un determinato livello
- C** quando l'indice di presentazione anziché ruotare sotto il pube rimane al diametro trasverso o posteriore
- D** quando si parla di presentazione di vertice con parte presentata asinclinica

30


A00030

Il termine "mobbing" non include:

- A** fornire standard professionali agli operatori
- B** l'azione emarginante dei colleghi
- C** l'azione ostacolante del Datore di Lavoro nella progressione di carriera
- D** azioni negative verso un soggetto preciso



QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

**Concorso Pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di Ostetrica -
Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari - da
assegnare presso le Aziende Sanitarie Provinciali Ferraresi**

PROVA SCRITTA 02



-
- 1 B00001
- Quale dei sotto elencati fattori non è un fattore di rischio di diabete gestazionale?**
- A** Minaccia di aborto
 - B** Età > 35 anni
 - C** Familiarità 1° grado per diabete tipo 2
 - D** Anamnesi di alterazioni glicometaboliche precedenti
-
- 2 B00002
- In una donna al terzo mese di gravidanza viene diagnosticata una infezione da toxoplasma in atto. In questo periodo il rischio fetale è:**
- A** molto elevato
 - B** minimo
 - C** morte intrauterina nel 90% dei casi
 - D** parto prematuro nell'80% dei casi
-
- 3 B00003
- Secondo l'art. 1 della Legge 29 Luglio 1975, n. 405: Istituzione dei consultori familiari, il servizio di assistenza alla famiglia ha come scopi:**
- A** la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte della coppia e del singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti; la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento; la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando metodi e farmaci adatti a ciascun caso
 - B** solo la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte della coppia e del singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti
 - C** solo la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento
 - D** solo la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando metodi e farmaci adatti a ciascun caso
-
- 4 B00004
- Quale di questi fattori di rischio non è ad alta evidenza di associazione con Malattie Sessualmente Trasmesse (MST)?**
- A** Nuovo partner negli ultimi sei mesi
 - B** Età < 25 anni
 - C** Dolore addominale
 - D** Anticipo dell'età del primo rapporto
-
- 5 B00005
- I probiotici a livello vaginale:**
- A** producono acido lattico e perossido di idrogeno e creano un biofilm che esercita un effetto barriera
 - B** esclusivamente producono acido lattico e perossido di idrogeno
 - C** esclusivamente creano un biofilm che esercita un effetto barriera
 - D** nessuna delle altre alternative è corretta
-

6

B00006

Affinché possa essere definito probiotico, un batterio deve:

- A** resistere all'azione digestiva di succo gastrico, enzimi intestinali e sali biliari; essere in grado di aderire alle cellule intestinali e colonizzarle e essere attivo e vitale a livello intestinale in quantità tale da giustificare gli eventuali effetti benefici osservati in studi di efficacia
- B** esclusivamente resistere all'azione digestiva di succo gastrico, enzimi intestinali e sali biliari
- C** esclusivamente essere in grado di aderire alle cellule intestinali e colonizzarle
- D** esclusivamente essere attivo e vitale a livello intestinale in quantità tale da giustificare gli eventuali effetti benefici osservati in studi di efficacia

7

B00007

L'assorbimento del ferro è ostacolato da:

- A** Fitati e tannini
- B** Ac. linoleico
- C** Ac. ascorbico
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

8

B00008

La sindrome feto-alcolica è caratterizzata da:

- A** anomalie facciali tipiche; ritardo di crescita pre e postnatale e ritardo mentale e disfunzioni cardiache e altre malformazioni
- B** esclusivamente anomalie facciali tipiche
- C** esclusivamente ritardo di crescita pre e postnatale e ritardo mentale
- D** esclusivamente disfunzioni cardiache e altre malformazioni

9

B00009

Per la rilevazione dei fattori di rischio psicosociali e di depressione post-partum (domande di Whooley), le domande che iniziano con "perché?"

- A** Possono essere percepite come inquisitive/investigative/valutative/giudicanti
- B** Possono essere percepite come valutative e/o giudicanti
- C** Possono essere percepite come inquisitive/investigative
- D** Vanno evitate per non compromettere la qualità del dialogo

10

B00010

In un servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nella sala criogenetica nell'utilizzare l'azoto serve:

- A** effettuare tutte le operazioni lentamente
- B** effettuare le operazioni velocemente
- C** mettersi sempre vicino al criocontenitore
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

-
- 11 **Tra le regole fondamentali per migliorare la sicurezza del paziente ospedalizzato si ritrova:** B00011
- A** l'adozione di un foglio unico di terapia
 - B** l'introduzione di sistemi premianti per il personale sanitario
 - C** la formazione del personale sui temi del governo clinico
 - D** l'adozione di organismi di controllo del governo economico
-
- 12 **Il ciclo circadiano:** B00012
- A** è il ciclo che scandisce i ritmi biologici dell'organismo nell'arco della giornata
 - B** è un poema epico che ha come protagonista l'eroe greco Circadio
 - C** è uno dei termini con cui viene indicata la sindrome da stress
 - D** nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 13 **Le donne positive al test HPV (Human Papilloma Virus) primario devono essere inviate direttamente a colposcopia?** B00013
- A** No
 - B** Sì
 - C** Solo se hanno meno di 30 anni
 - D** Solo se hanno avuto rapporti a rischio
-
- 14 **Per migliorare l'efficacia nel sostegno all'allattamento il professionista:** B00014
- A** individua la fase in cui la donna è rispetto all'allattamento
 - B** dà tutte le informazioni
 - C** non dà informazioni e aspetta che sia la donna a chiederle
 - D** nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 15 **Per costruire una relazione buona abbastanza con la paziente e i familiari, è importante al momento di dare una cattiva notizia:** B00015
- A** non cercare giustificazioni
 - B** non esprimere le proprie emozioni
 - C** riempire i silenzi imbarazzanti con parole
 - D** esprimere senza filtri la propria compassione
-

-
- 16 B00016
- In caso di tampone vagino-rettale sconosciuto:**
- A** si valutano eventuali fattori di rischio (febbre >38°C, PROM>18 ore, colonizzazione materna da Streptococco Beta emolitico di gruppo B (SGB) nella precedente gravidanza e urinocoltura positiva per SGB) che possano far considerare la donna come potenzialmente positiva
 - B** lo si considera sempre come positivo
 - C** lo si considera sempre come negativo
 - D** è sempre opportuna la profilassi antibiotica
-
- 17 B00017
- Nelle gravidanze con diabete gestazionale in trattamento dietetico ben compensato:**
- A** è raccomandato offrire l'induzione del travaglio di parto non prima delle 39 settimane e non oltre le 41 settimane di gestazione
 - B** non è raccomandata l'induzione del travaglio di parto
 - C** è raccomandata l'induzione del travaglio di parto tra 38 e 39 settimane di gestazione
 - D** è raccomandata l'induzione del travaglio di parto dalla 37ª settimana di gestazione
-
- 18 B00018
- La gravidanza comporta delle modificazioni anatomiche e fisiologiche quali:**
- A** aumenti del volume plasmatico, della ventilazione polmonare, della frequenza e gittata cardiaca , incremento ponderale con modificazione del baricentro e conseguente lordosi
 - B** aumento del volume plasmatico, della ventilazione polmonare, della frequenza e gittata cardiaca
 - C** aumento ponderale e modificazione del baricentro con conseguente lordosi
 - D** riduzione del volume plasmatico, della ventilazione polmonare, della frequenza e della gittata cardiaca
-
- 19 B00019
- La placenta previa:**
- A** rappresenta una controindicazione assoluta al parto per via vaginale; deve essere sospettata quando una gravida si presenta con sanguinamento genitale dopo le 20 settimane di gestazione e è un importante fattore di rischio per emorragia post-partum con eventuale necessità di emotrasfusione ed isterectomia
 - B** esclusivamente rappresenta una controindicazione assoluta al parto per via vaginale
 - C** esclusivamente deve essere sospettata quando una gravida si presenta con sanguinamento genitale dopo le 20 settimane di gestazione
 - D** esclusivamente è un importante fattore di rischio per emorragia post-partum con eventuale necessità di emotrasfusione ed isterectomia
-
- 20 B00020
- L'indice di shock ostetrico:**
- A** può essere calcolato facendo il rapporto tra frequenza cardiaca e la pressione arteriosa sistolica; in gravidanza è normale tra 0.7 e 0.9 ma non è affidabile in caso di disordini ipertensivi e preeclampsia e in caso di EPP (Emorragia Post Partum) è considerato un indicatore di gravità clinica
 - B** esclusivamente può essere calcolato facendo il rapporto tra frequenza cardiaca e la pressione arteriosa sistolica
 - C** esclusivamente in gravidanza è normale tra 0.7 e 0.9 ma non è affidabile in caso di disordini ipertensivi e preeclampsia
 - D** esclusivamente in caso di EPP (Emorragia Post Partum) è considerato un indicatore di gravità clinica
-

-
- 21 B00021
- Le controindicazioni al parto operativo vaginale sono:**
- A** dilatazione cervicale non completa; epoca gestazionale < 32 settimane per il maggior rischio di emorragie subgaleali e traumi dello scalpo fetale e parte presentata non impegnata e non di vertice
 - B** esclusivamente dilatazione cervicale non completa
 - C** esclusivamente epoca gestazionale < 32 settimane per il maggior rischio di emorragie subgaleali e traumi dello scalpo fetale
 - D** esclusivamente parte presentata non impegnata e non di vertice
-

- 22 B00022
- Quale fra i seguenti esami strumentali è più utile sempre da proporre alla paziente con endometriosi?**
- A** L'ecografia ginecologica transvaginale
 - B** La TAC con mdc
 - C** La RMN con contrasto
 - D** L'isteroscopia
-

- 23 B00023
- Il riflesso ossitocinico può provocare TUTTI i seguenti fenomeni ECCETTO uno:**
- A** aumento il senso di sete
 - B** stimola la contrazione uterina
 - C** aumenta la produzione di latte
 - D** causa la fuoriuscita del latte
-

- 24 B00024
- È corretto affermare che:**
- A** nella stessa poppata l'ultimo latte contiene più grassi del primo
 - B** il contenuto di grassi e zuccheri nella poppata dipende dalla alimentazione materna
 - C** nella stessa poppata il latte mantiene invariato le sue componenti
 - D** nella stessa poppata, l'ultimo latte contiene meno grassi del primo
-

- 25 B00025
- Per favorire il mantenimento del peso, una gravida obesa dovrebbe:**
- A** limitare l'apporto energetico mantenendo un equilibrio tra i nutrienti
 - B** ridurre fortemente i carboidrati
 - C** aumentare la quota proteica
 - D** aumentare i liquidi nella giornata
-

- 26 B00026
- Per sterilizzazione si intende:**
- A** un processo che permette l'uccisione di ogni organismo vivente (microrganismi patogeni, saprofiti, miceti, spora e virus)
 - B** un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili
 - C** un insieme di norme atte a impedire o rallentare la moltiplicazione dei germi patogeni e non patogeni
 - D** la detersione eseguita mediante l'uso di saponi liquidi ad alto potere detergente
-

27

B00027

Quali sono gli organi dell'Ordine delle Ostetriche?

- A** L'assemblea degli iscritti nell'anno - il consiglio direttivo - il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere, consigliere - il collegio dei revisori dei conti
- B** Presidente della Federazione nazionale degli Ordini, assemblea delle presidenti degli Ordini, revisori dei conti, tesoriere, consigliere
- C** Segretario verbalizzante, presidente, tesoriere, consigliere, collegio dei revisori dei conti
- D** Presidente e vicepresidente e assemblea degli iscritti

28

B00028

La sanzione disciplinare che NON può essere irrogata a livello aziendale è:

- A** la radiazione dall'albo
- B** il rimprovero
- C** la multa
- D** il licenziamento

29

B00029

La richiesta di Interruzione Volontaria di Gravidanza da parte di una minorenne:


- A** è posta dall'interessata e necessita dell'assenso dei genitori o del tutore
- B** deve essere sottoposta al Giudice Tutelare
- C** è vincolata all'autorizzazione del Giudice Tutelare
- D** è vincolata all'autorizzazione dei genitori

30


B00030

L'ematemesi indica:

- A** un episodio di vomito con presenza di sangue
- B** la rottura di capillari nelle cavità nasali
- C** l'emorragia rettale massiva
- D** la presenza di sangue occulto nelle feci



QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

**Concorso Pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di Ostetrica -
Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari - da
assegnare presso le Aziende Sanitarie Provinciali Ferraresi**

21/01/2024
S. L. L.

PROVA SCRITTA 03



-
- 7 C00007
- L'ecosistema vaginale è costituito:**
- A** il 95% della componente microbica spetta ai lattobacilli, mentre il rimanente 5% comprende batteri anaerobi
 - B** l'80% della componente microbica spetta ai lattobacilli, mentre il rimanente 20% comprende batteri anaerobi
 - C** il 90% della componente microbica spetta ai lattobacilli, mentre il rimanente 10% comprende batteri anaerobi
 - D** il 93% della componente microbica spetta ai lattobacilli, mentre il rimanente 7% comprende batteri anaerobi
-
- 8 C00008
- In Italia donne che hanno già avuto un figlio affetto da Difetti del Tubo Neurale (DTN) il rischio di DTN:**
- A** è 1 su 30 nati
 - B** non è valutabile
 - C** è 1 su 40/50 nati
 - D** è 1 su 75 nati
-
- 9 C00009
- Per la rilevazione dei fattori di rischio psicosociali e di depressione post-partum (domande di Whooley), durante un colloquio i "segnacontesto" sono:**
- A** modalità per introdurre domande che possono apparire non pertinenti o fuori contesto
 - B** modalità per motivare la legittimità di alcune domande che possono apparire inopportune
 - C** modalità per indicare in quali contesti un utente è legittimato a porre domande al professionista
 - D** modalità per indicare in quali contesti un utente non è legittimato a porre alcune domande al professionista
-
- 10 C00010
- All'interno di un servizio di Procreazione medicalmente assistita (PMA), quali sono le caratteristiche tecnologiche di una sala criobiologica?**
- A** Impianto di stoccaggio ed alimentazione azoto, impianto di distribuzione azoto
 - B** Controllo accessi
 - C** Segnaletica di sicurezza
 - D** Tutte le altre alternative sono corrette
-
- 11 C00011
- L'emivita dell'ossitocina è di:**
- A** 6-12 minuti
 - B** 30-45 minuti
 - C** 60-90 minuti
 - D** nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 12 C00012
- I dati sensibili sono:**
- A** dati inerenti lo stato di salute, le abitudini, il credo politico, origine razziale/etnica, convinzioni religiose
 - B** dati anagrafici
 - C** dati relativi lo status economico/sociale
 - D** nessuna delle altre alternative è corretta
-

13

C00013

A quale età si deve iniziare lo screening con Hpv (Human papilloma virus) test?

- A** 30 anni
- B** 25 anni
- C** 35 anni
- D** 22 anni

14

C00014

Alla dimissione di una donna dall'ospedale dopo il parto, è opportuno:

- A** verificare la presenza di difficoltà rispetto all'allattamento al seno
- B** insistere sull'allattamento al seno
- C** sconsigliare l'allattamento artificiale
- D** sulla base di quello che si è osservato in reparto nei giorni di degenza, chiedere o evitare di chiedere come va l'allattamento

15

C00015

Nel momento in cui dobbiamo comunicare anomalie emerse dal test di screening è meglio:

- A** introdurre l'argomento facendo domande su quanto è conosciuto ed è già stato detto alla donna, usando linguaggio e informazioni il più possibile conosciute e famigliari
- B** non preoccuparsi di fornire ulteriori informazioni ma solo indirizzare la donna dai colleghi più esperti nel campo
- C** portare esempi di altre situazioni fortunatamente in cui c'è stato solo un "falso allarme" e commentare i risultati rassicurando
- D** fornire tutte le informazioni sulle nuove ricerche scientifiche anche citando numeri, statistiche e probabilità

16

C00016

L'indice di Bishop:

- A** è il metodo più comunemente usato per la valutazione della cervice uterina; ha permesso una standardizzazione della valutazione del grado di maturazione cervicale e prende in considerazione le caratteristiche intrinseche della cervice uterina (lunghezza, posizione, appiattamento, consistenza) ed il livello della parte presentata nello scavo pelvico
- B** esclusivamente è il metodo più comunemente usato per la valutazione della cervice uterina
- C** esclusivamente ha permesso una standardizzazione della valutazione del grado di maturazione cervicale
- D** esclusivamente prende in considerazione le caratteristiche intrinseche della cervice uterina (lunghezza, posizione, appiattamento, consistenza) ed il livello della parte presentata nello scavo pelvico

17

C00017

La misurazione del liquido amniotico (LA):

- A** è ecografica e si calcola con l'amniotic fluid index (AFI) o con la misurazione della tasca massima di LA (liquido amniotico)
- B** è ecografica e si calcola esclusivamente con l'AFI (amniotic fluid index)
- C** è ecografica e si calcola esclusivamente mediante la misurazione della tasca massima di LA (liquido amniotico)
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

-
- 18 **L'induzione del travaglio di parto è controindicata in caso di:** C00018
- A** pregresso cesareo con incisione longitudinale o altra isterotomia ad alto rischio; precedente rottura d'utero e placenta previa o vasa previa
 - B** esclusivamente pregresso cesareo con incisione longitudinale o altra isterotomia ad alto rischio
 - C** esclusivamente precedente rottura d'utero
 - D** esclusivamente placenta previa o vasa previa
-
- 19 **L'esercizio fisico in gravidanza è controindicato:** C00019
- A** in caso di incontinenza cervicale e/o cerchiaggio cervicale; gravidanze multiple a rischio di parto pretermine e placenta previa oltre le 26 settimane di gestazione
 - B** esclusivamente in caso di incontinenza cervicale e/o cerchiaggio cervicale
 - C** esclusivamente gravidanze multiple a rischio di parto pretermine
 - D** esclusivamente placenta previa oltre le 26 settimane di gestazione
-
- 20 **Le principali manifestazioni del distacco intempestivo di placenta sono rappresentate da:** C00020
- A** sanguinamento vaginale associato a dolore addominale con tachisistolia e pattern cardiotocografici non rassicuranti
 - B** sanguinamento vaginale e dolore addominale
 - C** tachisistolia e pattern cardiotocografici non rassicuranti
 - D** nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 21 **La sorveglianza del benessere materno-fetale nella paziente che pianifica il TOLAC (travaglio di prova dopo taglio cesareo):** C00021
- A** prevede la registrazione cardiotocografica in continuo
 - B** prevede l'auscultazione intermittente nel I stadio del travaglio di parto
 - C** l'immersione in acqua è assolutamente controindicata
 - D** l'analgesia è controindicata in quanto costituisce un fattore di rischio causale per l'insuccesso del TOLAC (travaglio di prova dopo taglio cesareo) inoltre maschera eventuali sintomi e segni di rottura d'utero
-
- 22 **Le prove urodinamiche nella paziente con prolasso genitale:** C00022
- A** sono utili in caso di disfunzioni urinarie, pre-operatoriamente, perché possono orientare il counselling e la scelta di trattamento
 - B** sono inutili
 - C** sono obbligatorie prima di tutti i tipi di chirurgia del pavimento pelvico
 - D** non sono influenzate da una eventuale infezione transitoria delle vie urinarie
-

-
- 23 **Dove viene prodotto il latte materno?** C00023
- A** Negli acini
 - B** Nei seni lattiferi
 - C** Nei dotti galattofori
 - D** All'interno della areola
-
- 24 **Il biological nurturing richiede:** C00024
- A** che la madre sia informata sui riflessi primitivi neonatali e materni; la madre assuma una posizione che permetta l'espressione massima dei riflessi e l'operatore che assiste la madre non interferisca con l'espressione dei riflessi primitivi
 - B** esclusivamente che la madre sia informata sui riflessi primitivi neonatali e materni
 - C** esclusivamente che la madre assuma una posizione che permetta l'espressione massima dei riflessi
 - D** esclusivamente che l'operatore che assiste la madre non interferisca con l'espressione dei riflessi primitivi
-
- 25 **Quale tra queste non costituisce una possibilità di invio della donna al secondo livello di colposcopia:** C00025
- A** HPV test positivo/PAP test negativo
 - B** L-SIL
 - C** HPV test positivo persistente >12 mesi/PAP test negativo
 - D** ASC-H
-
- 26 **Indicare la corretta definizione di sterilizzazione.** C00026
- A** Completa distruzione o rimozione di microrganismi e delle spore dai materiali
 - B** Rimozione dalla superficie di un oggetto di materiale chimico contaminante
 - C** Completa distruzione dei batteri, dei virus, dei miceti, ma non necessariamente delle spore
 - D** Inattivazione dei batteri, dei virus, dei miceti, ma non necessariamente delle spore
-
- 27 **I cosiddetti "livelli essenziali di assistenza" (LEA), introdotti con il D.Lgs. 502/1992, rappresentano:** C00027
- A** le prestazioni sanitarie minime da garantire a tutti i cittadini dal Servizio sanitario nazionale
 - B** i trattamenti sanitari ritenuti appropriati ed efficaci sulla base della revisione della letteratura scientifica
 - C** le attività di prevenzione sanitarie garantite dalle strutture extraospedaliere
 - D** la dotazione organica minima di personale sanitario ai fini dell'accreditamento
-
- 28 **Per ectropion si intende:** C00028
- A** un'eversione della mucosa endocervicale
 - B** la presenza di endometrio in sede ectopica
 - C** una lesione infiammatoria della cervice
 - D** la presenza di mucosa cervicale in sede ovarica
-

29

C00029

L'obiettivo di un corso di Accompagnamento alla Nascita è quello di:


- A** offrire gli strumenti per poter fare scelte consapevoli in un clima il più possibile non giudicante
- B** dare informazioni tecniche, indicazioni rigide e precise per ottenere la completa delega della donna
- C** lanciare forti messaggi (verbali e non) su come si dovrebbe essere, pensare, agire
- D** insegnare il metodo RAT (Training Autogeno Respiratorio) come unico strumento del controllo del dolore

30

C00030

Se assunti durante il puerperio i seguenti farmaci passano nel latte materno, ECCETTO?

- A** Eparina
- B** Acido acetilsalicilico
- C** Eritromicina
- D** Tetraciclina



QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A

