

TABELLA B

INDICATORI DI PROCESSO E ESITO

ALLEGATO B

PROGETTI	PARAMETRI	LIVELLO A (ACCETTABILE PERFORMANCE)	LIVELLO B (OBIETTIVO OTTIMALE)
Gestione del paziente cronico che necessita di Farmaci a scuola	A partire dall'anno scolastico 2020/21 per i minori in carico al PLS redazione del protocollo individuale per i bambini/ragazzi che necessitano di somministrazione farmaci a scuola.	95% dei bambini cronici richiedenti	95% dei bambini cronici richiedenti
Vaccinazione antinfluenzale agli assistiti con patologia cronica	Per la campagna antinfluenzale 2020/21 la vaccinazione antinfluenzale viene effettuata dal PLS ai propri assistiti che rientrano nelle categorie di rischio, tenuto conto della circolare regionale	30% degli aventi diritto	50% degli aventi diritto
Sviluppo delle Pediatrie di Gruppo	Orario coordinato degli studi	8 ore	8 ore
Educazione sanitaria nelle CDS	Nelle CdS sono organizzati incontri periodici su tematiche, condivise con la PdC, nelle stesse sedi.	n. 1 evento/semestre	n. 1 evento/semestre
Progetto Proba (SBEA)	Utilizzo del web proba	almeno 50 schede	almeno 50 schede
Uso Appropriato Antibiotici	Prescrizione ATB	Indicatore: Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti Target: < 745 prescrizioni/1000 residenti Indicatore: Rapporto fra prescrizioni di amoxicillina non associata e prescrizioni di amoxicillina associata a inibitori enzimatici in età pediatrica Target: > 1.5 Indicatore: Tasso di prescrizione di cefalosporine in età pediatrica x 1.000 residenti Target: ≤ 70 Indicatore: Tasso di prescrizione territoriale di macrolidi in età pediatrica x 1.000 residenti Target: ≤ 130	Indicatore: Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti Target: < 700 prescrizioni / 1000 residenti Indicatore: Rapporto fra prescrizioni di amoxicillina non associata e prescrizioni di amoxicillina associata a inibitori enzimatici in età pediatrica Target: > 2.0 Indicatore: Tasso di prescrizione di cefalosporine in età pediatrica x 1.000 residenti Target: ≤ 65 Indicatore: Tasso di prescrizione territoriale di macrolidi in età pediatrica x 1.000 residenti Target: ≤ 125
Rete locale per le cure palliative	Adesione alle indicazioni aziendali	100 % dei pls	100 % dei pls
Ricoveri ospedalieri potenzialmente inappropriati	Riduzione dei ricoveri ospedalieri rispetto alla media dei PLS non associati (n. Dimessi per 1000/assistiti)	Inferiore alla media dei pls non associati	2 punti in meno dei pls non associati
Codici bianchi	Riduzione accessi per codici bianchi riferito alla media dei pls non associati (n. accessi per 1000 assistiti)	2 punti in meno rispetto ai pls non associati	4 punti in meno rispetto ai pls non associati